

## Så här bekämpar vi infektioner inom småbarnspedagogiken

Barn i daghem har oftare infektionssjukdomar än barn som är hemma. Smittsamma sjukdomar kan bekämpas med enkla åtgärder i samarbete med hemmet och småbarnspedagogiken. Daghemmet följer hygienanvisningar för att minska spridningen av infektioner. Så här gör ni för att minska spridningen av infektioner:



### Handtvätt

- När du kommer till dagis och när du kommer hem
- Efter att du varit på toaletten
- Före du äter
- Naglarna ska hållas korta



### Leksaker

- Tvätta leksakerna innan de tas till daghemmet. Rengör leksakerna på nytt när de tas hem.
- Sovleksaker förvaras i barnets eget fack när den inte används.



### Nappar

- Nappar används på dagis endast när barnet vilar.
- Tvätta napparna hemma.
- Rena nappar förvaras i en särskild ask i barnets fack.



### Tandtvätt

- Barnets tänder tvättas hemma på morgonen och kvällen.



### Vaccination

- På rådgivningen får barnet vaccinationer som ingår i det nationella programmet. Vaccin skyddar barnen mot olika sjukdomar och följsjukdomar. Vaccination mot säsonginfluensa ingår också i programmet tills barnet fyller 6 år. På rådgivningen ges influensavaccin också till barnets närmaste krets.

### Handtvätt:

- Skölj händerna
- Gnugga händerna noggrant med tvål, också tummarna och fingertopparna.
- Skölj händerna noggrant
- Torka händerna i pappershandduken och stäng kranen med en pappershandduk

19.1.2023

2 (2)

**När barnet insjuknar**

- Barnet ska bli hemma genast vid första symtom på en infektionssjukdom, eftersom förkylningar smittar mest i början av sjukdomen
- Småbarnspedagogiken ber vårdnadshavaren hämta barnet ifall barnet insjuknar under dagen

Sjukdom	När kan barnet återvända till småbarnspedagogiken? När symtomen har minskat avsevärt och hen orkar leka samt delta i daghemsverksamheten.
<b>Magsjuka och diarré</b>	Efter två symtomfria dagar. Undantagsvis EHEC, Shigella, Tyfoidfieber och Paratyfoidfieber. Smittskyddsteamet ger anvisningar om återgång till daghemmet i dessa fall.
<b>A-streptokock svalginfektion ("angina"), scharlakansfeber</b>	24 timmar efter att antibiotikabehandlingen påbörjats.
<b>Svinkoppor</b>	Antibiotika via munnen: 24 timmar efter att behandlingen påbörjats.  Lokalbehandling: 48 timmar efter att behandlingen påbörjats.
<b>Vattkoppor</b>	När vattkopporna torkat in och inga nya vattkoppor bildas, i allmänhet 5–6 dygn efter uppkomst.
<b>Skabb</b>	Följande dag efter första behandlingen.
<b>Öroninflammation, ögoninflammation, förkylning, influensa, höstblåsor, erythema infectiosum (parvorokko), tredagarsfeber</b>	När barnet orkar leka och delta i daghemmets verksamhet. En feberfri dag är en bra tumregel.
<b>Coronavirusjukdomen Covid-19</b>	Barnet kan gå till skolan eller daghemmet när symtomen tydligt har minskat, barnet inte längre har feber och allmäntillståndet är sådant att det orkar delta i undervisningen eller småbarnspedagogiken.
<b>Springmask, huvudlöss</b>	Vårdas hemma men kräver inte frånvaro från daghemmet.
<b>Mollusker</b>	Kräver inte frånvaro från daghemmet.
<b>Övriga sjukdomar</b>	Fråga rådgivningens personal.